


RISIKOFAKTORER

ALLE nyfødte scores med TVS-N ved 2 timers alder

Pasient-ID (barnets navnelapp)

INGEN RISIKOFAKTORER  Ingen flere skåringer

Risiko for infeksjon

- Vannavgang > 18 t, kun scoring ved 6+12 t
- Mor GBS i urin, ikke adekvat behandlet*
- Korioamnionitt
- Minst 2 unormale verdier i scoringskjema
- OBS! GBS-infeksjon hos tidligere barn innlegges 3D
- *Første dose min 4 timer før forløsning.
- *Disse barna skal være innlagt minst 48 t

TVS-N også 6-8 + 12 + 24 t alder

Føtal distress/asfyksi/intrapartum

- pH < 7,05 i navlearterie
- BE ≤ -12 mmol/l i navlearterie
- Aktivt ventilert lengre enn 5 min
- Apgar < 7 ved 5 min
- Tykt misfarget fostervann*
- *Ved tykt misfarget fostervann og minst 1 kryss ekstra: overflyttes 3D

*Mekoniumaspirasjon og pat. CTG/sectio/lav apgar/intubert/GA > 42 uker skal tilses av lege ved 1 t alder

TVS-N også 1 + 6-8 t alder

Risiko for lavt blodsukker
+
Følg prosedyre for hypoglykemi

Risiko for lavt blodsukker

- Minst 1 kryss på "føtal distress/asfyksi/intrapartum"
- Maternell diabetes (se prosedyre)
- Maternell bruk av beta-blokker (ikke trandate)
- FV > 4500 g eller FV < 2500 g
- SGA (se 2,5 percentil NATUS)
- Født før uke 37

Følg prosedyre for hypoglykemi

Rhesus-immunisering

Obs gulsott og anemi

Mistanke om syndrom

Varsle barnelege

Vakuumforløsning
obs. subgalealt hematom/økende hevelse

Sjekk hode rett etter fødsel + 2 t

Barn som skal ha legetilsyn/konferering med barnelege UMIDDELBART

Synlig gulsott / over behandlingsgrense < 24 timers alder

Gallefarget oppkast

Apnèer

Mistanke om kramper

Annet nyfødt barn man oppfatter som sykt

Se prosedyre ID 47725, kriterier for overflytning av barn fra Fode/barselavd

SKÅRINGSSKJEMA TVS-N - Tidlig varslingskår-nyfødte

Handling	Hvit obs	Fortsette observasjoner som planlagt			Pasient-ID (barnets navnelapp)			
	1 gul obs.	Varsle jordmor og revurder om 30 minutter						
	2 gule / 1 rød	Umiddelbart varsle vakthavende barnelege og ansvarlig						
	2 røde / 1 rød på nevrologi	Umiddelbart tilkalle vakthavende barnelege og varsle ansvarlig jordmor						
Født dato:	kl:	Forløpsningsmetode:						
GA:	Apgar (1-5-10 min):	Lengde	Vekt	HO				
Skriv når barnet skal observeres f.eks. "full skår 2, 6-8, 12 og 24 timer" eller "kun blodsukker ihht prosedyre":								
		Første 4 levetimer		4 - 24 levetimer			> 24 levetimer	
Sign. jordmor/barnepleier								
Dato								
Klokkeslett								
R E S P I R A S J O N	Respirasjons- frekvens (telles i 1 minutt)	80						
		70						
		60						
		50						
		30						
	P R E S S I N G	Pressing	Ja					
			Nei					
	P O S T D U K T A L S P O 2	Postduktal SpO ₂ (for)	≤ 89 %					
			90-94 %					
			≥ 95 %					
S I R K U L A S J O N	Puls i hvile	180						
		170						
		160						
		150						
		140						
		130						
		120						
		110						
		90						
		80						
S P I S I N G	Spising (ikke første 4 levetimer)	Ikke						
		Dårlig						
		Bra						
A T F E R D	N E V R O	Svært hypoton/uvekkbar/kramper						
		Hypoton/sitrer/irritabel						
		Normal tonus og atferd						
	T E M P E R A T U R	Temperatur* ny scoring 30 minutter etter tiltak	38					
			37					
			36					
	B E K Y M R I N G	Bekymring (foreldre/personale)	Ja					
			Nei					
	B L O D S U K K E R	Blodsukker (kun på indikasjon, se prosedyre for hypoglykemi)	≥ 2,6					
			2,0-2,5					
1,5-1,9								
1,1-1,4								
		≤ 1,0						

Skriv inn tallverdien på observasjonene i aktuell kolonne. På pressing, spising, atferd og bekymring marker med X i aktuell kolonne.